

2017年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅲ）

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. (5 分) 复平面内表示复数 $z=i(-2+i)$ 的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图。



根据该折线图，下列结论错误的是 ()

A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

4. (5 分) 已知 $\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

- A. $-\frac{7}{9}$ B. $-\frac{2}{9}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{7}{9}$


5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x+2y-6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ 则 $z=x-y$ 的取值范围是 ()

- A. $[-3, 0]$ B. $[-3, 2]$ C. $[0, 2]$ D. $[0, 3]$


6. (5分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 ()

- A. $\frac{6}{5}$ B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$


7. (5分) 函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为 ()




A.



B.




C.



D.

8. (5分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

9. (5分) 已知圆柱的高为1, 它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为()

A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

10. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则()

A. $A_1E \perp DC_1$ B. $A_1E \perp BD$ C. $A_1E \perp BC_1$ D. $A_1E \perp AC$

11. (5分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 ,

且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

12. (5分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a (e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 1

二、填空题

13. (5分) 已知向量 $\vec{a} = (-2, 3)$, $\vec{b} = (3, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m =$ _____.

14. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a =$ _____.

15. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C=60^\circ$, $b=\sqrt{6}$,

$c=3$, 则 $A=$ _____.

16. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值范围是_____.

三、解答题

17. (12分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+\dots+(2n-1)a_n=2n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\frac{a_n}{2n+1}\}$ 的前 n 项和.

18. (12分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^\circ\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率.


(1) 求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率;

(2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出 Y 的所有可能值, 并估计 Y 大于零的概率.

19. (12 分) 如图四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$.

(1) 证明: $AC \perp BD$;

(2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB=BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.



20. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y=x^2+mx-2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点,

点 C 的坐标为 $(0, 1)$, 当 m 变化时, 解答下列问题:

(1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由;

(2) 证明过 A 、 B 、 C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=kt \end{cases}$ (t 为参数)
, 直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m, \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C .

- (1) 写出 C 的普通方程;
- (2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho (\cos\theta + \sin\theta) - \sqrt{2}=0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

- (1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;
- (2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

2017 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅲ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【考点】1E: 交集及其运算.

【专题】11: 计算题; 37: 集合思想; 40: 定义法; 5J: 集合.

【分析】利用交集定义先求出 $A \cap B$, 由此能求出 $A \cap B$ 中元素的个数.

【解答】解: \because 集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{2, 4, 6, 8\}$,

$$\therefore A \cap B=\{2, 4\},$$

$\therefore A \cap B$ 中元素的个数为 2.

故选: B.

【点评】本题考查交集中元素个数的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意交集定义的合理运用.

2. (5 分) 复平面内表示复数 $z=i(-2+i)$ 的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【考点】A4: 复数的代数表示法及其几何意义.

【专题】35: 转化思想; 5N: 数系的扩充和复数.


【分析】利用复数的运算法则、几何意义即可得出.

【解答】解: $z=i(-2+i)=-2i-1$ 对应的点 $(-1, -2)$ 位于第三象限.

故选: C.

【点评】本题考查了复数的运算法则、几何意义，考查了推理能力与计算能力，属于基础题.

3. (5分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位:万人)的数据, 绘制了下面的折线图.



根据该折线图,下列结论错误的是()

- A. 月接待游客量逐月增加
 - B. 年接待游客量逐年增加
 - C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
 - D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

【考点】2K：命题的真假判断与应用；B9：频率分布折线图、密度曲线.

【专题】27: 图表型; 2A: 探究型; 5I: 概率与统计.

【分析】根据已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，逐一分析给定四个结论的正误，可得答案.

【解答】解：由已有中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据可得：

月接待游客量逐月有增有减，故 A 错误；

年接待游客量逐年增加，故 B 正确；

各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月, 故 C 正确;

各年1月至6月的月接待游客量相对于7月至12月，波动性更小，变化比较平

稳，故 D 正确；

故选：A.

【点评】本题考查的知识点是数据的分析，命题的真假判断与应用，难度不大，属于基础题.

4. (5 分) 已知 $\sin\alpha - \cos\alpha = \frac{4}{3}$ ，则 $\sin 2\alpha = (\quad)$
- A. $-\frac{7}{9}$ B. $-\frac{2}{9}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

【考点】GS: 二倍角的三角函数.

【专题】11: 计算题；35: 转化思想；40: 定义法；56: 三角函数的求值.

【分析】由条件，两边平方，根据二倍角公式和平方关系即可求出.

【解答】解： $\because \sin\alpha - \cos\alpha = \frac{4}{3}$ ，
 $\therefore (\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 1 - 2\sin\alpha\cos\alpha = 1 - \sin 2\alpha = \frac{16}{9}$ ，
 $\therefore \sin 2\alpha = -\frac{7}{9}$ ，

故选：A.

【点评】本题考查了二倍角公式，属于基础题.

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x+2y-6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ 则 $z = x - y$ 的取值范围是 ()
- A. $[-3, 0]$ B. $[-3, 2]$ C. $[0, 2]$ D. $[0, 3]$

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】11: 计算题；31: 数形结合；35: 转化思想；5T: 不等式.

【分析】画出约束条件的可行域，利用目标函数的最优解求解目标函数的范围即可.

【解答】解： x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x+2y-6 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ 的可行域如图：

目标函数 $z=x-y$, 经过可行域的 A, B 时, 目标函数取得最值,


由 $\begin{cases} x=0 \\ 3x+2y-6=0 \end{cases}$ 解得 A (0, 3),

由 $\begin{cases} y=0 \\ 3x+2y-6=0 \end{cases}$ 解得 B (2, 0),

目标函数的最大值为: 2, 最小值为: -3,

目标函数的取值范围: [-3, 2].

故选: B.



【点评】本题考查线性规划的简单应用, 目标函数的最优解以及可行域的作法是解题的关键.

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 ()

- A. $\frac{6}{5}$ B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

【考点】 HW: 三角函数的最值.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 57: 三角函数的图像与性质


【分析】 利用诱导公式化简函数的解析式, 通过正弦函数的最值求解即可.

【解答】 解: 函数 $f(x) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(-x + \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{6}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) \leq \frac{6}{5}$.


故选：A.

【点评】本题考查诱导公式的应用，三角函数的最值，正弦函数的有界性，考查计算能力.


7. (5分) 函数 $y=1+x+\frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为 ()




A.



B.



C.



【考点】3A: 函数的图象与图象的变换.

【专题】11: 计算题; 31: 数形结合; 35: 转化思想; 51: 函数的性质及应用.

【分析】通过函数的解析式, 利用函数的奇偶性的性质, 函数的图象经过的特殊点判断函数的图象即可.

【解答】解: 函数 $y=1+x+\frac{\sin x}{x^2}$, 可知: $f(x)=x+\frac{\sin x}{x^2}$ 是奇函数, 所以函数的图象关于原点对称,


则函数 $y=1+x+\frac{\sin x}{x^2}$ 的图象关于 $(0, 1)$ 对称,

当 $x \rightarrow 0^+$, $f(x) > 0$, 排除 A、C, 当 $x=\pi$ 时, $y=1+\pi$, 排除 B.

故选: D.

【点评】本题考查函数的图象的判断, 函数的奇偶性以及特殊点是常用方法.

8. (5分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【考点】EF：程序框图.

【专题】11：计算题；39：运动思想；49：综合法；5K：算法和程序框图.

【分析】通过模拟程序，可得到 S 的取值情况，进而可得结论.

【解答】解：由题可知初始值 $t=1, M=100, S=0$ ，

要使输出 S 的值小于 91，应满足“ $t \leq N$ ”，

则进入循环体，从而 $S=100, M=-10, t=2$ ，

要使输出 S 的值小于 91，应接着满足“ $t \leq N$ ”，

则进入循环体，从而 $S=90, M=1, t=3$ ，

要使输出 S 的值小于 91，应不满足“ $t \leq N$ ”，跳出循环体，

此时 N 的最小值为 2，

故选：D.

【点评】本题考查程序框图，判断出什么时候跳出循环体是解决本题的关键，注意解题方法的积累，属于中档题.

9. (5 分) 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ()

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LR：球内接多面体。

【专题】11：计算题；34：方程思想；40：定义法；5Q：立体几何。


【分析】推导出该圆柱底面圆周半径 $r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，由此能求出该圆柱的体积。

【解答】解： \because 圆柱的高为1，它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上，

$$\therefore \text{该圆柱底面圆周半径 } r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}，$$

$$\therefore \text{该圆柱的体积： } V = Sh = \pi \times (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \times 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

故选：B.



【点评】本题考查圆柱的体积的求法，考查圆柱、球等基础知识，考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力，考查化归与转化思想，是中档题。

10. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为棱 CD 的中点，则 ()

- A. $A_1E \perp DC_1$ B. $A_1E \perp BD$ C. $A_1E \perp BC_1$ D. $A_1E \perp AC$

【考点】LO：空间中直线与直线之间的位置关系。

【专题】11：计算题；31：数形结合；41：向量法；5G：空间角。

【分析】法一：连 B_1C ，推导出 $BC_1 \perp B_1C$ ， $A_1B_1 \perp BC_1$ ，从而 $BC_1 \perp$ 平面 A_1EBC_1 ，由此得到 $A_1E \perp BC_1$ 。

法二：以 D 为原点， DA 为 x 轴， DC 为 y 轴， DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能求出结果。

【解答】解：法一：连 B_1C ，由题意得 $BC_1 \perp B_1C$ ，

$\because A_1B_1 \perp$ 平面 B_1BCC_1 ，且 $BC_1 \subset$ 平面 B_1BCC_1 ，

$\therefore A_1B_1 \perp BC_1$,

$\because A_1B_1 \cap B_1C = B_1$,

$\therefore BC_1 \perp \text{平面 } A_1ECB_1$,

$\because A_1E \subset \text{平面 } A_1ECB_1$,

$\therefore A_1E \perp BC_1$.

故选: C.

法二: 以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD₁ 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

设正方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中棱长为 2,

则 A₁ (2, 0, 2), E (0, 1, 0), B (2, 2, 0), D (0, 0, 0), C₁ (0, 2, 2),

A (2, 0, 0), C (0, 2, 0),


$$\overrightarrow{A_1E} = (-2, 1, -2), \overrightarrow{DC_1} = (0, 2, 2), \overrightarrow{BD} = (-2, -2, 0),$$

$$\overrightarrow{BC_1} = (-2, 0, 2), \overrightarrow{AC} = (-2, 2, 0),$$

$$\because \overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{DC_1} = -2, \overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{BD} = 2, \overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0, \overrightarrow{A_1E} \cdot \overrightarrow{AC} = 6,$$

$\therefore A_1E \perp BC_1$.

故选: C.



【点评】本题考查线线垂直的判断, 是中档题, 解题时要认真审题, 注意向量法的合理运用.

11. (5 分) 已知椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A₁, A₂,

且以线段 A₁A₂ 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为()

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

【考点】K4：椭圆的性质.

【专题】34：方程思想；5B：直线与圆；5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，可得原点到直线的

$$\text{距离} \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} = a, \text{ 化简即可得出.}$$

【解答】解：以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切，

$$\therefore \text{原点到直线的距离} \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} = a, \text{ 化为: } a^2 = 3b^2.$$

$$\therefore \text{椭圆 } C \text{ 的离心率 } e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

故选：A.

【点评】本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式，考查了推理能力与计算能力，属于中档题.

12. (5分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a (e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点，则 $a = (\quad)$

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【考点】52：函数零点的判定定理.

【专题】11：计算题；33：函数思想；49：综合法；51：函数的性质及应用.

【分析】通过转化可知问题等价于函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象与 $y = a (e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象只有一个交点求 a 的值. 分 $a=0$ 、 $a<0$ 、 $a>0$ 三种情况，结合函数的单调性分析可得结论.

【解答】解：因为 $f(x) = x^2 - 2x + a (e^{x-1} + e^{-x+1}) = -1 + (x-1)^2 + a (e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}}) = 0$ ，

所以函数 $f(x)$ 有唯一零点等价于方程 $1 - (x-1)^2 = a (e^{x-1} + \frac{1}{e^{x-1}})$ 有唯一解，

等价于函数 $y=1-(x-1)^2$ 的图象与 $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象只有一个交点.

①当 $a=0$ 时, $f(x)=x^2-2x \geq -1$, 此时有两个零点, 矛盾;

②当 $a<0$ 时, 由于 $y=1-(x-1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

且 $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

所以函数 $y=1-(x-1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$, $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象的最高点为 $B(1, 2a)$,

由于 $2a < 0 < 1$, 此时函数 $y=1-(x-1)^2$ 的图象与 $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象有两个交点, 矛盾;

③当 $a>0$ 时, 由于 $y=1-(x-1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减,

且 $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增,

所以函数 $y=1-(x-1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$, $y=a(e^{x-1}+\frac{1}{e^{x-1}})$ 的图象的最低点为 $B(1, 2a)$,

由题可知点 A 与点 B 重合时满足条件, 即 $2a=1$, 即 $a=\frac{1}{2}$, 符合条件;

综上所述, $a=\frac{1}{2}$,

故选: C.

【点评】本题考查函数零点的判定定理, 考查函数的单调性, 考查运算求解能力, 考查数形结合能力, 考查转化与化归思想, 考查分类讨论的思想, 注意解题方法的积累, 属于难题.

二、填空题

13. (5分) 已知向量 $\vec{a}=(-2, 3)$, $\vec{b}=(3, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m=\underline{2}$.

【考点】9T: 数量积判断两个平面向量的垂直关系.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 40: 定义法; 5A: 平面向量及应用.

【分析】利用平面向量数量积坐标运算法则和向量垂直的性质求解.

【解答】解: \because 向量 $\vec{a} = (-2, 3)$, $\vec{b} = (3, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$,

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = -6 + 3m = 0,$$

解得 $m=2$.

故答案为: 2.

【点评】本题考查实数值的求法, 是基础题, 解题时要认真审题, 注意平面向量数量积坐标运算法则和向量垂直的性质的合理运用.

14. (5分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a = \underline{5}$.

【考点】KC: 双曲线的性质.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】利用双曲线方程, 求出渐近线方程, 求解 a 即可.

【解答】解: 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$,

$$\text{可得} \frac{3}{a} = \frac{3}{5}, \text{解得 } a = 5.$$

故答案为: 5.

【点评】本题考查双曲线的简单性质的应用, 考查计算能力.

15. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C=60^\circ$, $b=\sqrt{6}$, $c=3$, 则 $A = \underline{75^\circ}$.

【考点】HP: 正弦定理; HR: 余弦定理.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 40: 定义法; 58: 解三角形.

【分析】根据正弦定理和三角形的内角和计算即可

【解答】解: 根据正弦定理可得 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, $C=60^\circ$, $b=\sqrt{6}$, $c=3$,

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$\because b < c$,

$\therefore B = 45^\circ$,

$\therefore A = 180^\circ - B - C = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$,

故答案为: 75° .

【点评】本题考查了三角形的内角和以及正弦定理, 属于基础题

16. (5分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的

取值范围是 $(-\frac{1}{4}, +\infty)$.

【考点】3T: 函数的值.

【专题】32: 分类讨论; 4R: 转化法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】根据分段函数的表达式, 分别讨论 x 的取值范围, 进行求解即可.

【解答】解: 若 $x \leq 0$, 则 $x - \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$,

则 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 等价为 $x+1+x-\frac{1}{2}+1>1$, 即 $2x>-\frac{1}{2}$, 则 $x>-\frac{1}{4}$,

此时 $-\frac{1}{4} < x \leq 0$,

当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2^x > 1$, $x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$,

当 $x - \frac{1}{2} > 0$ 即 $x > \frac{1}{2}$ 时, 满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立,

当 $0 \geq x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{2} \geq x > 0$ 时, $f(x - \frac{1}{2}) = x - \frac{1}{2} + 1 = x + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$,

此时 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立,

综上 $x > -\frac{1}{4}$,

故答案为: $(-\frac{1}{4}, +\infty)$.

【点评】本题主要考查不等式的求解, 结合分段函数的不等式, 利用分类讨论的数学思想进行求解是解决本题的关键.

三、解答题

17. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+\dots+(2n-1)a_n=2n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\frac{a_n}{2n+1}\}$ 的前 n 项和.

【考点】 8E: 数列的求和; 8H: 数列递推式.

【专题】 34: 方程思想; 35: 转化思想; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】 (1) 利用数列递推关系即可得出.

(2) $\frac{a_n}{2n+1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$. 利用裂项求和方法即可得出.

【解答】 解: (1) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+3a_2+\dots+(2n-1)a_n=2n$.

$n \geq 2$ 时, $a_1+3a_2+\dots+(2n-3)a_{n-1}=2(n-1)$.

$$\therefore (2n-1)a_n=2. \therefore a_n=\frac{2}{2n-1}.$$

当 $n=1$ 时, $a_1=2$, 上式也成立.

$$\therefore a_n=\frac{2}{2n-1}.$$

$$(2) \frac{a_n}{2n+1} = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}.$$

$$\therefore \text{数列 } \{\frac{a_n}{2n+1}\} \text{ 的前 } n \text{ 项和} = (1 - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{5}) + \dots + (\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}) = 1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$$

【点评】 本题考查了数列递推关系、裂项求和方法, 考查了推理能力与计算能力, 属于中档题.

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月

份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

最高气温	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)	[25, 30)	[30, 35)	[35, 40)
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率。

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率；
- (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元)，当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时，写出 Y 的所有可能值，并估计 Y 大于零的概率。

【考点】 CB: 古典概型及其概率计算公式；CH: 离散型随机变量的期望与方差。

【专题】 11: 计算题；35: 转化思想；49: 综合法；51: 概率与统计。

【分析】 (1) 由前三年六月份各天的最高气温数据，求出最高气温位于区间 [20, 25) 和最高气温低于 20 的天数，由此能求出六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率。

- (2) 当温度大于等于 25°C 时，需求量为 500，求出 $Y=900$ 元；当温度在 $[20, 25)$ $^{\circ}\text{C}$ 时，需求量为 300，求出 $Y=300$ 元；当温度低于 20°C 时，需求量为 200，求出 $Y=-100$ 元，从而当温度大于等于 20 时， $Y>0$ ，由此能估计 Y 大于零的概率。

【解答】 解：(1) 由前三年六月份各天的最高气温数据，得到最高气温位于区间 [20, 25) 和最高气温低于 20 的天数为 $2+16+36=54$ ，根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。

如果最高气温不低于 25 ，需求量为 500 瓶，

如果最高气温位于区间 $[20, 25)$ ，需求量为 300 瓶，

如果最高气温低于 20 ，需求量为 200 瓶，

\therefore 六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率 $p=\frac{54}{90}=\frac{3}{5}$ 。

- (2) 当温度大于等于 25°C 时，需求量为 500，

$Y=450 \times 2=900$ 元，

当温度在 $[20, 25)$ $^{\circ}\text{C}$ 时，需求量为 300，

$$Y=300 \times 2 - (450 - 300) \times 2 = 300 \text{ 元},$$

当温度低于 20°C 时, 需求量为 200,

$$Y=400 - (450 - 200) \times 2 = -100 \text{ 元},$$

当温度大于等于 20°C 时, $Y > 0$,

由前三年六月份各天的最高气温数据, 得当温度大于等于 20°C 的天数有:

$$90 - (2+16) = 72,$$


$$\therefore \text{估计 } Y \text{ 大于零的概率 } P = \frac{72}{90} = \frac{4}{5}.$$

【点评】本题考查概率的求法, 考查利润的所有可能取值的求法, 考查函数、古典概型等基础知识, 考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力, 考查数形结合思想、化归与转化思想, 是中档题.

19. (12 分) 如图四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$.

(1) 证明: $AC \perp BD$;

(2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB=BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.



【考点】 LF: 棱柱、棱锥、棱台的体积; LW: 直线与平面垂直.

【专题】 11: 计算题; 31: 数形结合; 41: 向量法; 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 (1) 取 AC 中点 O , 连结 DO 、 BO , 推导出 $DO \perp AC$, $BO \perp AC$, 从而 $AC \perp$ 平面 BDO , 由此能证明 $AC \perp BD$.

(2) 法一: 连结 OE , 设 $AD=CD=\sqrt{2}$, 则 $OC=OA=1$, 由余弦定理求出 $BE=1$, 由 $BE=ED$, 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的高都是点 A 到平面 BCD 的高 h , $S_{\triangle DCE}=S_{\triangle BCE}$, 由此能求出四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比. 法二: 设 $AD=CD=\sqrt{2}$, 则

$AC=AB=BC=BD=2$, $AO=CO=DO=1$, $BO=\sqrt{3}$, 推导出 $BO \perp DO$, 以 O 为原点, OA 为 x 轴, OB 为 y 轴, OD 为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 由 $AE \perp EC$, 求出 $DE=BE$, 由此能求出四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.

【解答】证明: (1) 取 AC 中点 O , 连结 DO 、 BO ,

$\because \triangle ABC$ 是正三角形, $AD=CD$,

$\therefore DO \perp AC$, $BO \perp AC$,

$\because DO \cap BO=O$, $\therefore AC \perp$ 平面 BDO ,

$\because BD \subset$ 平面 BDO , $\therefore AC \perp BD$.

解: (2) 法一: 连结 OE , 由 (1) 知 $AC \perp$ 平面 OBD ,

$\because OE \subset$ 平面 OBD , $\therefore OE \perp AC$,

设 $AD=CD=\sqrt{2}$, 则 $OC=OA=1$, $EC=EA$,

$\because AE \perp CE$, $AC=2$, $\therefore EC^2+EA^2=AC^2$,

$\therefore EC=EA=\sqrt{2}=CD$,

$\therefore E$ 是线段 AC 垂直平分线上的点, $\therefore EC=EA=CD=\sqrt{2}$,

由余弦定理得:

$$\cos \angle CBD = \frac{BC^2 + BD^2 - CD^2}{2BC \cdot BD} = \frac{BC^2 + BE^2 - CE^2}{2BC \cdot BE},$$

即 $\frac{4+4-2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{4+BE^2-2}{2 \times 2 \times BE}$, 解得 $BE=1$ 或 $BE=2$,

$\because BE < BD=2$, $\therefore BE=1$, $\therefore BE=ED$,

\because 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的高都是点 A 到平面 BCD 的高 h ,

$\because BE=ED$, $\therefore S_{\triangle DCE}=S_{\triangle BCE}$,

\therefore 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比为 1.

法二: 设 $AD=CD=\sqrt{2}$, 则 $AC=AB=BC=BD=2$, $AO=CO=DO=1$,

$\therefore BO=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$, $\therefore BO^2+DO^2=BD^2$, $\therefore BO \perp DO$,

以 O 为原点, OA 为 x 轴, OB 为 y 轴, OD 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

则 $C(-1, 0, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $A(1, 0, 0)$,

设 $E(a, b, c)$, $\overrightarrow{DE}=\lambda \overrightarrow{DB}$, $(0 \leq \lambda \leq 1)$, 则 $(a, b, c-1)=\lambda(0, \sqrt{3}, -1)$

, 解得 $E(0, \sqrt{3}\lambda, 1-\lambda)$,

$\therefore \overrightarrow{CE}=(1, \sqrt{3}\lambda, 1-\lambda)$, $\overrightarrow{AE}=(-1, \sqrt{3}\lambda, 1-\lambda)$,


$$\because AE \perp EC, \therefore \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = -1 + 3\lambda^2 + (1 - \lambda)^2 = 0,$$

$$\text{由 } \lambda \in [0, 1], \text{ 解得 } \lambda = \frac{1}{2}, \therefore DE = BE,$$

\because 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的高都是点 A 到平面 BCD 的高 h ,

$$\therefore DE = BE, \therefore S_{\triangle DCE} = S_{\triangle BCE},$$

\therefore 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比为 1.



【点评】本题考查线线垂直的证明, 考查两个四面体的体积之比的求法, 考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识, 考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力, 考查数形结合思想、化归与转化思想, 是中档题.

20. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点,

点 C 的坐标为 $(0, 1)$, 当 m 变化时, 解答下列问题:

- (1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由;
- (2) 证明过 A 、 B 、 C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

【考点】KJ: 圆与圆锥曲线的综合.

【专题】34: 方程思想; 43: 待定系数法; 5B: 直线与圆.

【分析】(1) 设曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$, 运用韦达定理, 再假设 $AC \perp BC$, 运用直线的斜率之积为 -1 , 即可判断是否存在这样的情况;

(2) 设过 A、B、C 三点的圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ ($D^2+E^2-4F>0$)，由题意可得 $D=m$, $F=-2$, 代入 $(0, 1)$, 可得 $E=1$, 再令 $x=0$, 即可得到圆在 y 轴的交点, 进而得到弦长为定值.

【解答】解: (1) 曲线 $y=x^2+mx-2$ 与 x 轴交于 A、B 两点,

可设 $A(x_1, 0)$, $B(x_2, 0)$,

由韦达定理可得 $x_1x_2=-2$,

若 $AC \perp BC$, 则 $k_{AC} \cdot k_{BC}=-1$,

即有 $\frac{1-0}{0-x_1} \cdot \frac{1-0}{0-x_2}=-1$,

即为 $x_1x_2=-1$ 这与 $x_1x_2=-2$ 矛盾,

故不出现 $AC \perp BC$ 的情况;

(2) 证明: 设过 A、B、C 三点的圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ ($D^2+E^2-4F>0$)

,

由题意可得 $y=0$ 时, $x^2+Dx+F=0$ 与 $x^2+mx-2=0$ 等价,

可得 $D=m$, $F=-2$,

圆的方程即为 $x^2+y^2+mx+Ey-2=0$,

由圆过 $C(0, 1)$, 可得 $0+1+0+E-2=0$, 可得 $E=1$,

则圆的方程即为 $x^2+y^2+mx+y-2=0$,

另解: 设过 A、B、C 三点的圆在 y 轴上的交点为 $H(0, d)$,

则由相交弦定理可得 $|OA| \cdot |OB| = |OC| \cdot |OH|$,

即有 $2=|OH|$,

再令 $x=0$, 可得 $y^2+y-2=0$,

解得 $y=1$ 或 -2 .

即有圆与 y 轴的交点为 $(0, 1)$, $(0, -2)$,

则过 A、B、C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值 3.

【点评】本题考查直线与圆的方程的求法, 注意运用韦达定理和直线的斜率公式, 以及待定系数法, 考查方程思想和化简整理的运算能力, 属于中档题.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

【考点】 6B: 利用导数研究函数的单调性; 6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】 11: 计算题; 32: 分类讨论; 48: 分析法; 53: 导数的综合应用.

【分析】 (1) 题干求导可知 $f'(x) = \frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$ ($x > 0$), 分 $a=0$ 、 $a > 0$ 、 $a < 0$ 三种情况讨论 $f'(x)$ 与 0 的大小关系可得结论;

(2) 通过 (1) 可知 $f(x)_{\max} = f(-\frac{1}{2a}) = -1 - \ln 2 - \frac{1}{4a} + \ln(-\frac{1}{a})$, 进而转化

可知问题转化为证明: 当 $t > 0$ 时 $-\frac{1}{2}t + \ln t \leq -1 + \ln 2$. 进而令 $g(t) = -\frac{1}{2}t + \ln t$

, 利用导数求出 $y=g(t)$ 的最大值即可.

【解答】 (1) 解: 因为 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$,

求导 $f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax + (2a+1) = \frac{2ax^2 + (2a+1)x + 1}{x} = \frac{(2ax+1)(x+1)}{x}$, ($x > 0$),

①当 $a=0$ 时, $f'(x) = \frac{1}{x} + 1 > 0$ 恒成立, 此时 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

②当 $a > 0$, 由于 $x > 0$, 所以 $(2ax+1)(x+1) > 0$ 恒成立, 此时 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

③当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得: $x = -\frac{1}{2a}$.

因为当 $x \in (0, -\frac{1}{2a})$ 时 $f'(x) > 0$ 、当 $x \in (-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 时 $f'(x) < 0$,

所以 $y=f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上单调递增、在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减.

综上可知: 当 $a \geq 0$ 时 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上单调递增、在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减;

(2) 证明: 由 (1) 可知: 当 $a < 0$ 时 $f(x)$ 在 $(0, -\frac{1}{2a})$ 上单调递增、在 $(-\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减.

$\frac{1}{2a}, +\infty$ 上单调递减,

所以当 $x=-\frac{1}{2a}$ 时函数 $y=f(x)$ 取最大值 $f(x)_{\max}=f\left(-\frac{1}{2a}\right)=-1-\ln 2-\frac{1}{4a}+\ln\left(-\frac{1}{a}\right)$.

从而要证 $f(x) \leq -\frac{3}{4a}-2$, 即证 $f\left(-\frac{1}{2a}\right) \leq -\frac{3}{4a}-2$,
即证 $-1-\ln 2-\frac{1}{4a}+\ln\left(-\frac{1}{a}\right) \leq -\frac{3}{4a}-2$, 即证 $-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{a}\right)+\ln\left(-\frac{1}{a}\right) \leq -1+\ln 2$.

令 $t=-\frac{1}{a}$, 则 $t>0$, 问题转化为证明: $-\frac{1}{2}t+\ln t \leq -1+\ln 2$ (*)

令 $g(t)=-\frac{1}{2}t+\ln t$, 则 $g'(t)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{t}$,

令 $g'(t)=0$ 可知 $t=2$, 则当 $0< t < 2$ 时 $g'(t) > 0$, 当 $t > 2$ 时 $g'(t) < 0$,

所以 $y=g(t)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增、在 $(2, +\infty)$ 上单调递减,

即 $g(t) \leq g(2)=-\frac{1}{2} \times 2+\ln 2=-1+\ln 2$, 即 (*) 式成立,

所以当 $a<0$ 时, $f(x) \leq -\frac{3}{4a}-2$ 成立.

【点评】本题考查利用导数研究函数的单调性, 考查分类讨论的思想, 考查转化能力, 考查运算求解能力, 注意解题方法的积累, 属于中档题.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=kt \end{cases}$ (t 为参数)

, 直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m, \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k

变化时, P 的轨迹为曲线 C .

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

【考点】 QH: 参数方程化成普通方程.

【专题】34: 方程思想; 4Q: 参数法; 4R: 转化法; 5S: 坐标系和参数方程.

【分析】解: (1) 分别消掉参数 t 与 m 可得直线 l_1 与直线 l_2 的普通方程为 $y=k(x-2)$ ①与 $x=-2+ky$ ②; 联立①②, 消去 k 可得 C 的普通方程为 $x^2-y^2=4$;

(2) 将 l_3 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$ 化为普通方程: $x+y-\sqrt{2}=0$,

再与曲线 C 的方程联立, 可得 $\begin{cases} x=\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y=\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, 即可求得 l_3 与 C 的交点 M 的极径为 $\rho=\sqrt{5}$.

【解答】解: (1) \because 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=2+t \\ y=kt \end{cases}$ (t 为参数) ,

\therefore 消掉参数 t 得: 直线 l_1 的普通方程为: $y=k(x-2)$ ①;

又直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x=-2+m \\ y=\frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数) ,

同理可得, 直线 l_2 的普通方程为: $x=-2+ky$ ②;

联立①②, 消去 k 得: $x^2-y^2=4$, 即 C 的普通方程为 $x^2-y^2=4$ ($x \neq 2$ 且 $y \neq 0$);

(2) $\because l_3$ 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)-\sqrt{2}=0$,

\therefore 其普通方程为: $x+y-\sqrt{2}=0$,

联立 $\begin{cases} x+y=\sqrt{2} \\ x^2-y^2=4 \end{cases}$ 得: $\begin{cases} x=\frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y=\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

$\therefore \rho^2=x^2+y^2=\frac{18}{4}+\frac{2}{4}=5$.

$\therefore l_3$ 与 C 的交点 M 的极径为 $\rho=\sqrt{5}$.

【点评】本题考查参数方程与极坐标方程化普通方程, 考查函数与方程思想与等价转化思想的运用, 属于中档题.

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. 已知函数 $f(x)=|x+1|-|x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

【考点】R4: 绝对值三角不等式; R5: 绝对值不等式的解法.

【专题】32: 分类讨论; 33: 函数思想; 4C: 分类法; 4R: 转化法; 51: 函数的性质及应用; 5T: 不等式.

【分析】(1) 由于 $f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x-1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$, 解不等式 $f(x) \geq 1$

1 可分 $-1 \leq x \leq 2$ 与 $x > 2$ 两类讨论即可解得不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 依题意可得 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$, 分 $x \leq 1$ 、 $-1 < x < 2$ 、 $x \geq 2$ 三类讨论, 可求得 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$, 从而可得 m 的取值范围.

【解答】解: (1) $\because f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x-1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$, $f(x) \geq 1$,

\therefore 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $2x-1 \geq 1$, 解得 $1 \leq x \leq 2$;

当 $x > 2$ 时, $3 \geq 1$ 恒成立, 故 $x > 2$;

综上, 不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x | x \geq 1\}$.

(2) 原式等价于存在 $x \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立,

即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$.

由(1)知, $g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$

当 $x \leq -1$ 时, $g(x) = -x^2 + x - 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} > -1$,

$\therefore g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5$;

当 $-1 < x < 2$ 时, $g(x) = -x^2 + 3x - 1$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$,

$\therefore g(x) \leq g(\frac{3}{2}) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = \frac{5}{4}$;

当 $x \geq 2$ 时, $g(x) = -x^2+x+3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x=\frac{1}{2} < 2$,

$\therefore g(x) \leq g(2) = -4+2+3=1$;

综上, $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$,

$\therefore m$ 的取值范围为 $(-\infty, \frac{5}{4}]$.

【点评】本题考查绝对值不等式的解法, 去掉绝对值符号是解决问题的关键, 突出考查分类讨论思想与等价转化思想、函数与方程思想的综合运用, 属于难题.