

南京市、盐城市 2021 届高三年级第二次模拟考试

数学参考答案

一、单项选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. B 7. D 8. B

二、多项选择题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求的。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分)

9. ACD 10. BC 11. ABD 12. AC

三、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 36 14. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ 15. $\sqrt{6}$ 16. $\frac{3}{4}, 2$ (第一问 2 分，第二问 3 分)

四、解答题：本大题共 6 小题，共 70 分。

17. (本小题满分 10 分)

解：在 $\triangle ABC$ 中， $B = \pi - (A + C)$ ，所以 $\sin B = \sin(A + C)$ 。

因为 $\sin B - \sin(A - C) = \sqrt{3}\sin C$ ，所以 $\sin(A + C) - \sin(A - C) = \sqrt{3}\sin C$ ，……………2 分

即 $\sin A \cos C + \cos A \sin C - (\sin A \cos C - \cos A \sin C) = \sqrt{3}\sin C$ ，

所以 $2\cos A \sin C = \sqrt{3}\sin C$ 。……………4 分

在 $\triangle ABC$ 中， $\sin C \neq 0$ ，所以 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

因为 $0 < A < \pi$ ，所以 $A = \frac{\pi}{6}$ 。……………6 分

选择①

方法 1

因为 $A = \frac{\pi}{6}$ ，所以 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = b^2 + 9 - 3\sqrt{3}b$ 。

又因为 $b = \sqrt{3}a$ ，所以 $2b^2 - 9\sqrt{3}b + 27 = 0$ ，解得 $b = 3\sqrt{3}$ ，或 $b = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，

此时 $\triangle ABC$ 存在。……………8 分

当 $b = 3\sqrt{3}$ 时， $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ 。

当 $b = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 时， $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{8}$ 。……………10 分

方法 2

因为 $b = \sqrt{3}a$, 由正弦定理, 得 $\sin B = \sqrt{3}\sin A = \sqrt{3}\sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$, 或 $B = \frac{2\pi}{3}$, 此时 $\triangle ABC$ 存在. 8 分

当 $B = \frac{\pi}{3}$ 时, $C = \frac{\pi}{2}$, 所以 $b = c\cos A = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{8}$.

当 $B = \frac{2\pi}{3}$ 时, $C = \frac{\pi}{6}$, 所以 $b = \frac{c\sin B}{\sin C} = 3\sqrt{3}$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$ 10 分

选择②

因为 $a = 3\cos B$, 所以 $a = 3 \times \frac{a^2 + 9 - b^2}{6a}$, 得 $a^2 + b^2 = 9$,

所以 $C = \frac{\pi}{2}$, 此时 $\triangle ABC$ 存在. 8 分

因为 $A = \frac{\pi}{6}$, 所以 $b = 3 \times \cos \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $a = 3 \times \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab = \frac{9\sqrt{3}}{8}$ 10 分

选择③

由 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $a\sin C = c\sin A = \frac{3}{2}$, 8 分

这与 $a\sin C = 1$ 矛盾, 所以 $\triangle ABC$ 不存在. 10 分

18. (本小题满分 12 分)

解: (1) **方法 1**

因为 $S_n = 2^n + r$,

所以当 $n=1$ 时, $S_1 = a_1 = 2 + r$.

当 $n=2$ 时, $S_2 = a_1 + a_2 = 4 + r$, 故 $a_2 = 2$.

当 $n=3$ 时, $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 8 + r$, 故 $a_3 = 4$.

因为 $\{a_n\}$ 是等比数列, 所以 $a_2^2 = a_1 a_3$, 化简得 $2 + r = 1$, 解得 $r = -1$, 3 分

此时 $S_n = 2^n - 1$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 2^n - 1 - 2^{n-1} - 1 = 2^{n-1}$,

当 $n=1$ 时, $a_1 = S_1 = 1$, $a_n = 2^{n-1}$,

所以 $r=-1$ 满足题意.5 分

方法 2

因为 $S_n=2^n+r$, 所以当 $n=1$ 时, $S_1=a_1=2+r$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n=S_n-S_{n-1}=2^n+r-2^{n-1}-r=2^{n-1}$3 分

因为 $\{a_n\}$ 是等比数列, 所以 $2+r=1$, 解得 $r=-1$5 分

(2) 因为 $a_n=2^{n-1}$, 所以 $b_n=2(1+\log_2 a_n)=2n$7 分

因为 $a_1=1, a_2=2=b_1, a_3=4=b_2, a_4=8=b_4, a_5=16=b_8, a_6=32=b_{16},$

$a_7=64=b_{32}, a_8=128=b_{64}, a_9=256=b_{128},$ 9 分

所以 $c_1+c_2+c_3+\dots+c_{100}$

$= (b_1+b_2+b_3+\dots+b_{107})-(a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8)$ 11 分

$= \frac{107 \times (2+214)}{2} - \frac{2(1-2^7)}{1-2} = 11302$12 分

19. (本小题满分 12 分)

解: (1) 对项目 A 投资的统计数据进行计算, 有 $\bar{x}=3, \bar{y}=0.6, \sum_{i=1}^n x_i^2=55$.

所以 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{11 - 5 \times 3 \times 0.6}{55 - 5 \times 3^2} = 0.2$,4 分

$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x} = 0.6 - 0.2 \times 3 = 0$,

所以回归直线方程为: $\hat{y} = 0.2x$6 分

线性相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2)(\sum_{i=1}^n y_i^2 - n \bar{y}^2)}} = \frac{11 - 5 \times 3 \times 0.6}{\sqrt{(55 - 5 \times 3^2)(2.24 - 5 \times 0.6^2)}}$
 $= \frac{2}{\sqrt{4.4}} \approx 0.9524 > 0.95$

这说明投资金额 x 与所获利润 y 之间的线性相关关系较强, 用线性回归方程 $\hat{y} = 0.2x$ 对该组数据进行拟合合理.8 分

(2) 设对 B 项目投资 $x(1 \leq x \leq 6)$ 百万元, 则对 A 项目投资 $(7-x)$ 百万元.

所获总利润 $y = 0.16x - \frac{0.49}{x+1} + 0.49 + 0.2(7-x)$ 10 分

$= 1.93 - [0.04(x+1) + \frac{0.49}{x+1}] \leq 1.93 - 2\sqrt{0.04(x+1) \times \frac{0.49}{x+1}} = 1.65,$

当且仅当 $0.04(x+1) = \frac{0.49}{x+1}$, 即 $x=2.5$ 时取等号,

所以对 A, B 项目分别投资 4.5 百万元, 2.5 百万元时, 获得总利润最大. …… 12 分

20. (本小题满分 12 分)

(1) 证明: 取 AB 中点 D , 连接 CD, B_1D .

因为三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, 所以 $AB \perp CD, CD = \sqrt{3}, BD = 1$.

又因为 $AB \perp B_1C$, 且 $CD \cap B_1C = C, CD, B_1C \subset \text{平面 } B_1CD$,

所以 $AB \perp \text{平面 } B_1CD$.

又因为 $B_1D \subset \text{平面 } B_1CD$, 所以 $AB \perp B_1D$. …… 2 分

在直角三角形 B_1BD 中, $BD = 1, B_1B = 2$, 所以 $B_1D = \sqrt{3}$.

在三角形 B_1CD 中, $CD = \sqrt{3}, B_1D = \sqrt{3}, B_1C = \sqrt{6}$,

所以 $CD^2 + B_1D^2 = B_1C^2$, 所以 $CD \perp B_1D$. …… 4 分

又因为 $AB \perp B_1D, AB \cap CD = D, AB, CD \subset \text{平面 } ABC$, 所以 $B_1D \perp \text{平面 } ABC$.

又因为 $B_1D \subset \text{平面 } ABB_1A_1$, 所以平面 $ABB_1A_1 \perp \text{平面 } ABC$. …… 6 分

(2) 解: 以 DC, DA, DB_1 所在直线为 x, y, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $A(0, 1, 0), B(0, -1, 0), C(\sqrt{3}, 0, 0), B_1(0, 0, \sqrt{3})$,

因此 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 1, \sqrt{3}), \overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, -1, 0), \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = (0, 1, \sqrt{3})$.

因为点 P 在棱 BB_1 上, 则设 $\overrightarrow{BP} = \lambda \overrightarrow{BB_1} = \lambda(0, 1, \sqrt{3})$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$.

则 $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{CB} + \lambda \overrightarrow{BB_1} = (-\sqrt{3}, -1 + \lambda, \sqrt{3}\lambda)$. …… 8 分

设平面 ACC_1A_1 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

$$\text{由} \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0, \end{cases} \text{得} \begin{cases} \sqrt{3}x - y = 0, \\ y + \sqrt{3}z = 0. \end{cases}$$


取 $x = 1, y = \sqrt{3}, z = -1$,

所以平面 ACC_1A_1 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, \sqrt{3}, -1)$.

…………… 10 分

因为直线 CP 与平面 ACC_1A_1 所成角的正弦值为 $\frac{4}{5}$,

$$\text{所以} \cos \langle \mathbf{n}, \overrightarrow{CP} \rangle = \frac{\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CP}}{|\mathbf{n}| \times |\overrightarrow{CP}|} = \frac{-2\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{3 + (\lambda - 1)^2 + 3\lambda^2}} = -\frac{4}{5},$$



(第 20 题图)

化简得 $16\lambda^2 - 8\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{4}$,

所以 $BP = \lambda BB_1 = \frac{1}{2}$ 12 分

21. (本小题满分 12 分)

解: 由 $\begin{cases} y = x + m, \\ y^2 = 4x, \end{cases}$ 得 $y^2 - 4y + 4m = 0$.

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = 4$, $y_1 y_2 = 4m$.

因为直线 l 与 C 相交, 所以 $\Delta = 16 - 16m > 0$, 得 $m < 1$ 2 分

(1) 由 $\overrightarrow{AT} = 2\overrightarrow{TB}$, 得 $y_1 + 2y_2 = 0$, 4 分

所以 $4 + y_2 = 0$, 解得 $y_2 = -4$, 从而 $y_1 = 8$,

因为 $y_1 y_2 = 4m$, 所以 $4m = -32$, 解得 $m = -8$ 6 分

(2) 设 $M(x_3, y_3)$, $N(x_4, y_4)$,

因为 M, N 两点关于直线 $y = x + m$ 对称,

则 $\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} = \frac{y_4 - y_3}{\frac{y_4^2}{4} - \frac{y_3^2}{4}} = \frac{4}{y_4 + y_3} = -1$, 解得 $y_4 = -4 - y_3$.

又 $\frac{y_4 + y_3}{2} = \frac{x_4 + x_3}{2} + m$,

于是 $\frac{-4 - y_3 + y_3}{2} = \frac{x_4 + x_3}{2} + m$, 解得 $x_4 = -4 - 2m - x_3$ 8 分

又点 N 在抛物线上, 于是 $(-4 - y_3)^2 = 4(-4 - 2m - x_3)$.

因为 $y_3^2 = 4x_3$, 所以 $y_3^2 + 4y_3 + 16 + 4m = 0$, 10 分

于是 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 - x_3)(x_2 - x_3) + (y_1 - y_3)(y_2 - y_3)$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_3^2}{4}\right)\left(\frac{y_2^2}{4} - \frac{y_3^2}{4}\right) + (y_1 - y_3)(y_2 - y_3) \\ &= \frac{(y_1 - y_3)(y_2 - y_3)}{16}[(y_1 + y_3)(y_2 + y_3) + 16] \\ &= \frac{(y_1 - y_3)(y_2 - y_3)}{16}[y_1 y_2 + y_3(y_1 + y_2) + y_3^2 + 16] \\ &= \frac{(y_1 - y_3)(y_2 - y_3)}{16}(4m + 4y_3 + y_3^2 + 16) = 0, \end{aligned}$$

因此 $MA \perp MB$, 同理 $NA \perp NB$,

于是点 M, N 在以 AB 为直径的圆上, 即 A, B, M, N 四点共圆. 12 分

22. (本小题满分 12 分)

解: (1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x\sin x - x - 1$,

$$\text{则 } f'(x) = e^x - \frac{1}{2}(x\cos x + \sin x) - 1, f''(x) = e^x + \frac{1}{2}x\sin x - \cos x.$$

因为 $x \in [0, \pi]$, 所以 $e^x \geq 1$, $\frac{1}{2}x\sin x \geq 0$, 因此 $f''(x) \geq 1 - \cos x \geq 0$, 2 分

所以 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增, 于是 $f'(x) \geq f'(0) = 0$,

因此 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增, 所以 $f(x) \geq f(0) = 0$ 4 分

(2) 由 (1) 知, 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) \geq e^x - \frac{1}{2}x\sin x - x - 1 \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时取等号, 此时函数 $f(x)$ 仅有 1 个零点. 6 分

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 因为 $f(x) = e^x - ax\sin x - x - 1$,

$$\text{所以 } f'(x) = e^x - a(x\cos x + \sin x) - 1, f''(x) = e^x + a(x\sin x - 2\cos x).$$

当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递增.

$$\text{当 } x \in [0, \frac{\pi}{2}] \text{ 时, } f'''(x) = e^x + a(3\sin x + x\cos x).$$

因为 $e^x > 0$, $a(3\sin x + x\cos x) \geq 0$, 所以 $f'''(x) > 0$, 所以 $f''(x)$ 单调递增.

$$\text{又 } f''(0) = 1 - 2a < 0, f''(\frac{\pi}{2}) = e^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2}a > 0,$$

因此 $f''(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上存在唯一的零点 x_0 , 且 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 8 分

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递增.

$$\text{又 } f'(0) = 0, f'(x_0) < f'(0) = 0, f'(\pi) = e^\pi + a\pi - 1 > 0,$$

因此 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上存在唯一的零点 x_1 , 且 $x_1 \in (x_0, \pi)$ 10 分

当 $x \in (0, x_1)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_1, \pi)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增.

$$\text{又 } f(0) = 0, f(x_1) < f(0) = 0, f(\pi) = e^\pi - \pi - 1 > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 (x_1, π) 上存在唯一零点, 因此 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有两个零点.

综上, a 的取值范围是 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 12 分